


## עבודת קיץ – גיאומטריה (4 יחידות)

**בעיות עם משולשים ומרובעים (כולל פרופורציה ודמיון)**



המרובעים ABCD ו-BFGD הם מקביליות.


נתון:  $CG = CF$  (

- C על הקטע GF).

A. הוכח: המרובע ECGD הוא מקבילית.

B. הוכח: אם המקבילית ABCD היא מעוין,

אז המרובע ECGD הוא מלבן.



הנקודה D נמצאת על הצלע BC של משולש ABC.


כך ש-  $\angle ADB < 90^\circ$ .

נקודה E נמצאת על המשך הקטע AD.

כך ש-  $AC = BE$ ,  $AD = DE$ .

A. הוכח: AD תיכון ל- BC במשולש ABC.

B. הוכח:  $S_{ABD} = S_{BDE}$ .




הנקודה D נמצאת על הצלע BC של משולש ABC.

שווה-שוקיים  $(AB = AC)$ .

G היא נקודת המשך הצלע AB.

הקטע FE מקביל ל- BC.

נתון:  $AE \perp BC$ . הוכח:  $\frac{GF}{BF} = \frac{AG}{AC}$ .




המשולשים ADE ו-ADE הם משולשים שווי-צלעות. הקטעים CD ו-BE נחתכים בנקודת F.

A. הוכח:  $BE = CD$ .

B. הוכח:  $\triangle ACD \cong \triangle ABE$ .

C. חשב את הזווית BFC.

תשובה: ג.  $60^\circ$ .



במשולש ABC (

- $AB = AC$ )

 BE ו- CD הם גבחים לשוקיים.

M היא נקודת המפגש בין הגבחים.

A. (1) הוכח כי  $BD = EC$ .

(2) הוכח כי  $DE \parallel BC$ .

B. נתון:  $\angle ABC = 60^\circ$ .

ממצא את היחס  $\frac{DM}{MC}$ .

תשובה: ב.  $\frac{1}{2}$ .

. AE · EB = CE · ED ו- CD נחתכים בנקודה E . נתון : . 11

א. הוכח כי  $\triangle AEC \sim \triangle DEB$

ב. הוכח כי  $\triangle AED \sim \triangle CEB$

ג. נתון גם :  $CB \parallel AD$


$\triangle AEC \cong \triangle DEB$

ד. נתון גם :  $\frac{AD}{CB} = \frac{5}{3}$ ,  $AC \perp CE$  :

3 ס"מ =


(1) חשב את האורך של ED

(2) חשב את האורך של AC



תשובה: ד.(1) 5 ס"מ. (2) 4 ס"מ.

. 12



משולש ABC הוא משולש ישר-זווית

$(\angle ABC = 90^\circ)$ . BE הוא תיכון לצלע AC

ו- CD הוא תיכון לצלע AB .


התיכונים BE ו- CD נחתכים בנקודה F .

א. חשב את היחס  $\frac{FB}{AC}$

ב. חשב את היחס בין היקף המשולש BFC  
להיקף המשולש EFD .

ג. נתון גם כי הנקודה M היא אמצע הקטע FC , והנקודה N היא אמצע הקטע FB . הוכח כי המרובע DEMN הוא מקבילית .

תשובה: א.  $\frac{1}{3}$ . ב. 2.



. AB = AC , AK = AL : במשולש ABC נתון :

M היא נקודת המפגש בין הקטעים CK ו- BL .


א. הוכח: (1)  $LB = KC$

(2)  $MK = ML$

(3)  $\angle MAC = \angle MAB$

ב. נתון : מצא את היחס  $\frac{CM}{MK} = \frac{7}{3}$

תשובה: ב.  $\frac{7}{3}$ .



. 14 בטרפז ABCD ( $BC \parallel AD$ ) הנקודות M ו- N

הם אמצעי הבסיסים, הקטעים DM ו- CN

נחתכים בנקודה Q , הקטעים AM ו- BN


נחתכים בנקודה P (ראה ציור).

א. הוכח : PQ  $\parallel$  AD .

ב. נתון גם : AD = 2a , BC = a :

הבע באמצעות a את אורך הקטע PQ .

תשובה: ב.  $\frac{2}{3}a$ .




.15. במשולש שווה-שוקיים  $ABC$  ( $AB = AC$ ) חסום מלבן  $EFGH$ , כך שהאלכסון  $HF$  מאונך לשוק  $AC$ .  $AD$  הוא תיכון לבסיס  $BC$ . נתון:  $AD = BC$

$$\text{א. הוכח: } \frac{GC}{FG} = \frac{1}{2}$$

ב. הוכח:  $\Delta HGF \sim \Delta FGC$

ג. נתון:  $10 \text{ ס"מ} = HG$ . מצא את  $GC$ .

תשובה: ג.  $2.5 \text{ ס"מ}$ .




.16.  $ABCD$  הוא דלתון שבו  $BC = DC$  ו-  $AB = AD$ . נקודת על הצלע  $DC$  נקודה על הצלע  $BF$  החוצה את הזווית  $ADC$ , ו-  $BF$  החוצה את הזווית  $ABC$ .  $DE$  ו-  $BF$  נפגשים בנקודה  $G$  (ראה ציור).

א. הוכח: (1)  $GB = GD$

$$\Delta BGE \cong \Delta DGF \quad (2)$$

ב. הוכח כי המרובע  $DBEF$  הוא טרפז שווה-שוקיים.



.17. המרובע  $ABCD$  הוא מקבילית (ראה ציור).

$$\text{א. הוכח: } \frac{BF}{FA} = \frac{AD}{AE}$$


$$\text{ב. (1) הוכח: } \frac{S_{\Delta ADF}}{S_{\Delta AEF}} = \frac{AD}{AE}$$

(2) היעזר בסעיף א' ובתת סעיף ב' (1),

$$\text{והוכח: } S_{\Delta ADF} = S_{\Delta BEF}$$


## טריגונומטריה במישור (4 יחידות)

הערה: התרגילים כוללים שימוש בפונקציות סינוס, קוסינוס וטנגנס במשולש ישר-זווית, ושימוש במשפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים.



1. במשולש ישר-זווית ABC נתון:  $AB = 6 \text{ ס''מ}$ ,  $\angle BAC = \alpha$ ,  $\angle ABC = 90^\circ$ . BD הוא גובה ליתר BE הוא חוצה-זווית של  $\angle DBC$ . הבע את אורך הקטע EC באמצעות  $\alpha$ .

$$\text{תשובה: } 6 \sin \alpha (\tan \alpha - \tan \frac{\alpha}{2})$$




2. במלבן ABCD נתון:  $AB = 8.4 \text{ ס''מ}$ ,  $AM = 10 \text{ ס''מ}$ ,  $AC = AK$ . חשב את אורך הקטע MK.

$$\text{תשובה: } 2.828 \text{ ס''מ.}$$


3. במשולש ABC נתון:  $\angle ACB = 30^\circ$ ,  $BC = 10 \text{ ס''מ}$ ,  $AB = 6 \text{ ס''מ}$ . חשב את אורך הצלע AC.

$$\text{תשובה: } 5.344 \text{ ס''מ או } 11.98 \text{ ס''מ.}$$



4. במשולש ישר-זווית ABC ( $\angle C = 90^\circ$ ) נתון:  $\angle ABC = 32^\circ$ ,  $AB = 28.3 \text{ ס''מ}$ . על הנקודות AC ו- BC בנו משולשים שוו-צלעות ACP ו- BCQ. חשב את אורך הקטע PQ.

$$\text{תשובה: } 37.74 \text{ ס''מ.}$$




5. ABCD הוא טרפז ישר-זווית ( $BC \perp DC$ ,  $AB \parallel CD$ ). נתון:  $\angle ACD = \alpha$ ,  $\angle ACD = \alpha$ .  
א. הבע באמצעות  $\alpha$  את היחס בין שטח המשולש ACD לשטח המשולש ABC.  
ב. חשב את היחס הנילכאי אשר  $\alpha = 60^\circ$ .

$$\text{תשובה: א. } \frac{1}{\cos \alpha} . \text{ ב. } 2 .$$

.7 אורך צלע במשולש הוא 15 ס"מ ואחת הזוויות שלידיה היא  $68^\circ$ . אורך חוצה-זווית זו הוא 11 ס"מ. חשב את האורך של שתי הצלעות האחרות.

תשובה: 15.26 ס"מ, 11.90 ס"מ.



- .8 במשולש ABC נתונים:  $\angle A = 42^\circ$ ,  $AC = 8$  ס"מ וצלע BC אורך ב- 5 ס"מ מהצלע AB. א. חשב את אורך הצלע BC. ב. BD הוא תיכון לצלע AC. חשב את שטח המשולש BCD.


תשובה: א. 6.782 ס"מ. ב. 2.385 סמ"ר.

- .10 במשולש ABC נתונים:  $\angle BAC = 120^\circ$ ,  $AB = 2AC$ . מצא את גודلن של הזוויות B ו-C.

תשובה:  $40.89^\circ$ ,  $19.11^\circ$ .


## בעיות המשלבות גיאומטריה וטריגונומטריה

השאלות הבאות משלבות ידע מגיאומטריה וטריגונומטריה.




- .1 במשולש ABC, BD ו- CE הם גבהים לצלעות AC ו- AB. נתונים:  $BD = CE$ . א. הוכח: המשולש ABC הוא שווה-שוקיים. ב. נתונים:  $CE = 8$  ס"מ,  $5$  ס"מ = DC. חשב את הזוויות BAC.

תשובה: ב.  $64.01^\circ$ .




- .2 AD הוא הגובה ל- BC במשולש ABC. EF הוא הגובה ל- BC במשולש EBC. נתונים:  $EF = FD = DC$ . א.  $AG = 3DG$ . ב. נתונים:  $DF = 2DG$ . חשב את הזוויות ACG.

תשובה: ב.  $36.87^\circ$ .




- .3 במשולש ABC חסום מעוין BPQR. נתונים:  $BP = 4.8$  ס"מ,  $BC = 12$  ס"מ. א. מצא את אורך הצלע AB. ב. נתונים גס:  $\angle BAC = 72^\circ$ . חשב את אורך הקטע CQ.

תשובה: א. 8 ס"מ. ב. 7.051 ס"מ.



- .5 AD הוא חוצה-זווית A במשולש ABC (ראה ציור). נתונים:  $\angle BAC = 50^\circ$ ,  $DC = 5$  ס"מ,  $BD = 4$  ס"מ. א. מצא את היחס בין הצלע AC לבין הצלע AB. ב. מצא את אורך הצלע AB.

תשובה: א. 4:5. ב. 9.207 ס"מ.



- .9.  $\triangle ABC$  ו-  $\triangle BQR$  הם גבאים במשולש  $CR$ ,  $CP = CR$ , נחטכים בנקודה  $P$ . נתון:  $9 \text{ ס''מ} = 6 \text{ ס''מ}$ ,  $BP = 8 \text{ ס''מ}$ ,  $\angle BPR = \angle CPQ$ .
- הוכח:  $\triangle BPR \sim \triangle CPQ$ .
  - חשב את שטח המשולש  $CPQ$ .
  - חשב את הזווית  $PCQ$ .

תשובה: ב.  $18 \text{ ס''מ}^2$ . ג.  $31.37^\circ$ .


## הנדסה אנליטית (4 יחידות)

- .1. במשולש  $ABC$  משוואת הצלע  $BC$  היא  $y = \frac{1}{4}x + \frac{11}{4}$ . נתון:  $A(-1;11)$  הוא הגובה לצלע  $BC$ . מצא את שיעורי הנקודה  $D$ .

תשובה:  $(1;3)$ .

- .2. במשולש  $ABC$  משוואת הגובה לצלע  $AB$  היא  $y = 2x - 5$  ומשוואת הגובה לצלע  $AC$  היא  $y = x - 3$ . אחד מקדוקי המשולש הוא בנקודה  $(13;-9)$ .
- איזה מקדוקי המשולש הוא בנקודה  $(13;-9)$ ?
  - מצא את שני הקדוקים האחרים של המשולש.

תשובה: א.  $C(7;9)$ , ב.  $B(-3;-1)$ .



- .3. במשולש  $ABC$  הוא אכן אמצעי לצלע  $BC$ . משוואת התיכון  $AD$  היא  $y = \frac{5}{3}x - \frac{4}{3}$ . משוואת  $DE$  היא  $y = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$ . משוואת הצלע  $AB$  היא  $y = \frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$ . מצא את שיעורי הקדוקים  $A$ ,  $B$  ו-  $C$ .


תשובה:  $C(3;-1)$ ,  $B(1;5)$ ,  $A(5;7)$

- .4. במשולש  $ABC$  משוואת הצלע  $AB$  היא  $y = 3x - 5$ . נתון: משוואת התיכון  $CD$  לצלע  $AB$  היא  $y = -x + 15$ .
- מצא את שיעורי הקדוק  $A$ .
  - $S_{ADC} = S_{BDC}$ : הוכח.

תשובה: א.  $(6;13)$ .

- .5. א. מצא את הנקודות על הישר  $x + 2 = y$  שמרחקן מהנקודה  $(7;8)$  הוא  $5$ .
- ב. מצא נקודה על הישר  $4 = x$  הנמצאת במרחק שווה מהנקודות  $F(6;4)$  ו-  $E(1;9)$ .

תשובה: א.  $(4;6)$  או  $(3;5)$ . ב.  $(10;12)$ .



- .6. בציור מתוארים הישרים  $AD$  ו-  $BC$  הנחטכים בנקודה  $P(6;6)$ . משוואת הישר  $BC$  היא  $y = mx + 3$ . שטח המשולש  $ABP$  הוא  $27 \text{ יח}^2$ .
- מצא את הערך של  $m$ .
  - חשב את שטח המרובע  $BODP$  ( $O$  - ראשית הצירים).

תשובה: א.  $\frac{1}{2}$ . ב.  $45 \text{ יח}^2$ .

7. המשולש ABC הוא ישר-זווית. משווהת היתר AC היא  $y = -\frac{1}{3}x + 7$  ומשווהת היתר BC היא  $x = 2y$ . הנקודה (1; -2) נמצאת על היתר AB.  
 א. מצא את שיעורי הקדקוד A.  
 ב. מצא את משווהת הגובה ליתר AC.

תשובה: א.  $(-2; 1)$ . ב.  $y = 3x - 42$ .

8. במשולש ישר-זווית ABC, הזווית ACB היא ישרה. נתון:  $A = (0; 6)$ ,  $B = (21; 9)$ , והקדקוד C נמצא על ציר ה- $x$ . מהם שיעורי הקדקוד C?  
 מצא את שני הפתרונות האפשריים,  $C_1$  ו- $C_2$ .

תשובה: (3; 0) או (0; 18).

9. במשולש שווה-שוקיים ABC ( $AB = AC$ ) נתון:  $C(-1; 14)$ ,  $B(3; 16)$ .  
 א. מצא את שיעורי הקדקוד A, אם נתון שהוא נמצא על הישר  $y = 9$ .  
 ב. מצא את משווהת הגובה לשוק AC.


תשובה: א.  $(4; 9)$ . ב.  $y = x + 13$ .

10. ABC הוא משולש ישר-זווית ושווה-שוקיים ( $\angle C = 90^\circ$ ).  
 נתון:  $C(8; 3)$ ,  $B(4; 1)$ .  
 א. מצא את משווהת היתר AC.  
 ב. מצא את שיעורי הנקודה A (שני פתרונות).

תשובה: א.  $(-1; 7)$ . ב.  $(6; 7)$  או  $(10; -1)$ .

11. במקבילית ABCD משווהת הצלע AB היא  $y = \frac{1}{3}x + 7$  ומשווהת הצלע AD היא  $y = -2x - 7$ . אלכסוני המקבילית נפגשים בנקודה (3; 4.5).  
 מצא את שיעורי קודודי המקבילית.

תשובה: D(-3; -1), C(12; 4), B(9; 10), A(-6; 5).

12. נתונה מקבילית OABC. קודקוד O בראשית הצירים. משווהת הצלע AB היא  $y = 4$ . נתון:  $\angle OAC = 90^\circ$ ,  $C(10; 0)$ .  
 א. מצא את השיעורים של הקודקוד A (רשום את שתי האפשרויות).  
 ב. חשב את שטח המקבילית, עברו כל אחת מהאפשרויות שמצוות בסעיף א'.
- 

תשובה: א.  $(2; 4)$  או  $(4; 8)$ . ב. 40 יח"ר או 40 יח"ר.

13. ABCD הוא מלבן שניים מקדקודיו הם  $A(1; 2)$  ו- $B(-1; -2)$ . האלכסון AC נמצא על הישר  $7x + ky = 15$ .  
 א. מצא את הערך של  $k$ .  
 ב. מצא את שני הקדקודים האחרים של המלבן.

תשובה: א. 4. ב.  $C(5; -5)$ ,  $D(7; -1)$ .

14. ABCD הוא מלבן שניים מקדקודיו הם  $A(-3; -2)$  ו- $B(-2; -4)$ . אורך הצלע AB הוא  $2\sqrt{17}$ .  
 א. מצא את שיעורי הקדקוד B. רשום את שתי האפשרויות.  
 ב. מצא את שיעורי הקדקוד C. רשום את שתי האפשרויות.

**תשובה:** א.  $(5;0)$  או  $(-11;-4)$ . ב.  $(4;4)$  או  $(-12;0)$ .

15. במעוין ABCD, שניים מהקודות הם  $A(3;1)$  ו-  $B(7;4)$ . משווהת האלכסון  $AC$  היא  $-5x + 2y = 0$ . מצא את שיעורי הקודות C ו- D.

**תשובה:**  $D(3;6)$ ,  $C(7;9)$ .

16. במעוין ABCD האלכסון AC מונח על הישר  $y = -8x + 2$ , הצלע AB מונחת על הישר  $y = -8x + 2$ . אלכסוני המעוין נחתכים על ציר ה- x.  
א. מצא את קודקי המעוין.  
ב. חשב את שטח המעוין.

**תשובה:** א.  $60$ . ב.  $D(8;-2)$ ,  $C(7;6)$ ,  $B(0;2)$ ,  $A(1;-6)$ .

17. שני קודות סמוכים של ריבוע הם בנקודות  $A(1;4)$  ו-  $B(3;4)$ .  
א. מצא את משווהת הצלע BC.  
ב. מצא את שיעורי הקודקود C (שתי אפשרויות).

**תשובה:** א.  $x = 3$ . ב.  $(3;6)$  או  $(3;2)$ .

18. קודקודי המרובע ABCD הם:  $D(5;4)$ ,  $C(11;1)$ ,  $B(12;4)$ ,  $A(8;6)$ .  
א. הוכח שהמרובע הוא טרפז.  
ב. חשב את אורך הגובה היורד מקודקוד A לצלע DC.  
ג. חשב את שטח הטרפז.

**תשובה:** ב.  $\sqrt{98}$ . ג.  $17.5$ .


## חשבון דיפרנציאלי – פולינומיים (4 ייחדות)

1. הישר  $y = 5x - 3$  חותך את הפרבולה  $y = x^2 + 1$  בשתי נקודות.

א. מצא את משוואות המשיקים לפרבולה בנקודות אלה.

ב. מצא את נקודות החיתוך בין שני המשיקים שמצאת בסעיף א'.

**תשובה:** א.  $y = 4x - 3$ , ב.  $(0; -3)$ .



לגרף הפונקציה  $y = x^2 + 2x + 3$  משבירים משיק

בנקודה A(2,3). המשיק חותך את ציר ה-

y בנקודה B. מנוקודה A מורידים אנך

לציר ה- x. חשב את שטח הטרפז

ABOC (O - ראשית הצירים).

**תשובה:** 10.

3. הישר  $y = 2x + 4$  משיק לgraf הפונקציה  $f(x) = x^2 + 8x + c$

מצא את ערכו של c.

**תשובה:** 13.

לgraf הפונקציה  $y = ax^2 + 1$  משבירים משיק בנקודה  $x = 1$ .

א. הביע באמצעות a את משוואת המשיק.

ב. המשיק שמצאת בסעיף א' חותך את ציר ה- x בנקודה שבה  $x = 2$ .

מצא את a.

**תשובה:** א.  $a = -\frac{1}{3}$ , ב.  $y = 2ax + 1 = -\frac{2}{3}x + 1$ .

חקרו את הפונקציות הבאות על פי הסעיפים הבאים ומצאו :

א. תחום הגדרה. ב. נקודות מינימום ומקסימום. ג. תחומי עלייה וירידה.

ד. נקודות חיתוך עם הצירים. ה. שרטט את graf הפונקציה.

$$y = x^4 - 18x^2 + 32 \quad .6 \quad y = x(12 - x^2) \quad .5$$

7. נתונה הפונקציה  $f(x) = -x^3 + 15x^2 - 63x + 49$ .

א. חקרו את הפונקציה ומצאו : תחום הגדרה, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, נקודות חיתוך עם ציר ה- y.

ב. הראה שאחת נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה- x היא (1;0).

ג. שרטט סקיצה של graf הפונקציה.

ד. כמה נקודות משותפות יש לגרף הפונקציה ולציר ה- x?

8. חקרו את הפונקציה  $y = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2$ .

ב. נקודות מינימום ומקסימום. ג. תחומי עלייה וירידה.

ד. נקודות חיתוך עם הצירים. ה. שרטט סקיצה של graf הפונקציה.





- .9. נתונה הפונקציה  $y = x^4 - 4x^2$ .  
 א. חקוך את הפונקציה ומצא: תחום הגדרה, נקודות קיצון, נקודות חיתוך עם הצירים.  
 ב. מצא את תחומי החיבור והשליליות של הפונקציה.  
 ג. מצא לאילו ערכים של  $k$ , הפונקציה חותכת את הישר  $y = k$ :  
 (1) ב- 4 נקודות. (2) ב- 3 נקודות. (3) ב- 2 נקודות. (4) באף נקודה.

.10. לפונקציה  $f(x) = -\frac{x^3}{3} - x^2 + mx + 10$  יש נקודה קיצון ב-1=x.  
 א. מצא את  $m$ .

ב. מצא את נקודות המקסימום והמינימום של הפונקציה,

ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. מצא כמה פתרונות יש למשוואה  $0 = f(x) - 13$ .



- .9. א. תחום הגדרה: כל  $x$ . נקודות קיצון:  $(-\sqrt{2}; -4)$ , מינימום,  $(0; 0)$  מקסימום,  $(-\sqrt{2}; 0)$ , מינימום. נקודות חיתוך:  $(0; 0)$ ,  $(2; 0)$ ,  $(-\sqrt{2}; -4)$ .  
 ב. חיבור:  $x > 2$  או  $-2 < x < 2$ , שליליות:  $x \neq 0$ ,  $-2 < x < 2$ .  
 ג.  $k < -4$  (4).  $k = -4$  (2).  $k > 0$  (3).  $k = 0$  (2).  $-4 < k < 0$  (1).

**תשובות:**

.5. א. כל  $x$ .

ב. (2;16) מקסימום, (-2;-16) מינימום.

ג. עלייה:  $-2 < x < 2$ ,

ירידה:  $x > 2$  או  $x < -2$ .

ד.  $(-3.464; 0)$ ,  $(3.464; 0)$ ,  $(0; 0)$ .

.6. א. כל  $x$ .

ב. (3;-49), מינימום, (0;32), מקסימום, (-3;-49), מינימום.

ג. עלייה:  $x < 0$  או  $x > 3$

ירידה:  $x < -3$  או  $0 < x < 3$ .

ד.  $(-\sqrt{2}; 0)$ ,  $(\sqrt{2}; 0)$ ,  $(-4; 0)$ ,  $(4; 0)$ ,  $(0; 32)$ .

.7. א. תחום הגדרה: כל  $x$ .

נקודות קיצון: (3;-32), מינימום,

(7;0) מקסימום.

עליה:  $3 < x < 7$ ; ירידה:  $x > 7$  או  $x < 3$ .

נקודות חיתוך:  $(0; 49)$ .

ד. בשתי נקודות.

.8. א. כל  $x$ .

ב.  $(0; 0)$  מינימום.


ג. עלייה:  $x > 0$ , ירידה:  $x < 0$ .

ד.  $(0; 0)$ .

- .9. א. תחום הגדרה: כל  $x$ . נקודות קיצון:  $(-\sqrt{2}; -4)$ , מינימום,  $(0; 0)$  מקסימום,  $(\sqrt{2}; -4)$ , מינימום. נקודות חיתוך:  $(0; 0)$ ,  $(2; 0)$ ,  $(-\sqrt{2}; -4)$ .  
 ב. חיבור:  $x > 2$  או  $-2 < x < 2$ , שליליות:  $x \neq 0$ ,  $-2 < x < 2$ .  
 ג.  $k < -4$  (4).  $k = -4$  (2).  $k > 0$  (3).  $k = 0$  (2).  $-4 < k < 0$  (1).

.10 א. 3.

- ב.  $(\frac{2}{3}; 1)$  מקסימום,  $(1; -3)$  מינימום.  
ג. פתרון אחד.



- .11 הפונקציה  $y = x^3 - 15x^2 + 48x$  מוגדרת בקטע  $[0, 11]$ .  
א. מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה.  
ב. הסבר מדוע גרף הפונקציה חותך את ציר ה- $x$  בשלוש נקודות שונות.

תשובה: א. 41, -67.

- .12 מצא את משוואת המשיק לפונקציה  $y = (x^2 - 8)^5$  בנקודה  $x = 3$ .


תשובה:  $y = 30x - 89$ .

- .13 לגרף הפונקציה  $y = (x+4)^3$  מעבירים שני משיקים בעלי שיפוע 3.  
א. מצא את שיעורי נקודות ההשקה.  
ב. מצא את משוואות המשיקים.

תשובה: א.  $y = 3x + 14$ ,  $y = 3x + 10$ . ב.  $(-5; -1)$ ,  $(-3; 1)$ .

- .14 מצא עבור הפונקציה  $y = (x^2 - 6x)^3$ :  
א. נקודות מינימום ומקסימום. ב. תחומי עלייה וירידה.  
ג. נקודות חיתוך עם הצירים. ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

- .15 לפונקציה  $f(x)$  יש רק נקודת קיצון אחת והיא נקודת מקסימום ב- $x = -2$ .  
א. מהו הסימן של פונקציית הנגזרת  $f'(x)$  עבור  $x < -2$ ?  
ב. איזה מן הגрафים הבאים (1, 2, 3, 4) יכול לתאר את גרף הנגזרת  $f'(x)$  של הפונקציה  $f(x)$ ? נמק את בחירתך.



- .16 לפונקציה  $g(x)$  יש שתי נקודות קיצון בלבד. נקודות מקסימום ב- $x = -1$  ונקודות מינימום ב- $x = 5$ . שרטט גרף של הפונקציה הנגזרת  $g'(x)$ .

- .17 בציור מתואר גרף הנגזרת  $f'(x)$  של פונקציה  $f(x)$ .  
א. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה  $f(x)$ .  
ב. מצא את שיעורי ה- $x$  של נקודות הקיצון של הפונקציה  $f(x)$  וקבע את סוג הקיצון.  
ג. נתון גם:  $f(0) = 0$ . שרטט סקיצה של גרף הפונקציה  $f(x)$ .


- . 18. נתונה הפונקציה  $a > 0$ ,  $y = x^2 + 4ax - 5a^2$ .
- א. מצא: תחומי הגדרה, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, נקודות חיתוך עם הצירים (במידת הצורך, הביע תשובהותיך באמצעות  $a$ ).
- ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
- ג. נתון כי המרחק בין שתי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה- $x$  הוא 8. מהי נקודות החיתוך של הגרף עם ציר ה- $y$ ?

**תשובות:**



. 14. א.  $(3; -729)$  מינימום.

ב. עלייה:  $x < 3$ , ירידה:  $x > 3$ .

ג. א.  $(0; 0)$ , ב.  $(6; 0)$ .




. 15. א. חיובי. ב. גраф 1.



. 17. א. עלייה:  $x < -2$  או  $x > 2$ , ירידה:  $-2 < x < 2$ .

ב.  $x = -2$  מקסIMUM,  $x = 2$  מינימום.



. 18. א. תחומי הגדרה: כל  $x$ .

נקודות קיצון:  $(-2a; -9a^2)$  מינימום.

תחומי עלייה:  $x < -2a$ , תחומי ירידה:  $x > -2a$ .

נקודות חיתוך:  $(-5a; 0)$ ,  $(a; 0)$ ,  $(0; -5a^2)$ .

ג.  $(0; -8\frac{8}{9})$ .

## עבודת קיז – פונקציות רצינוליות (4 יחידות)

1. נתונה הפונקציה  $y = \frac{x^2 + 8x}{x^2 + 8}$ .

א. מצא: תחומי הגדרה, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, נקודות חיתוך עם הצירים, אסימפטוטות מקבילות לצירים.

ב. שרטט סקיצה של גраф הפונקציה.

ג. מצא לאיילו ערכי  $a$ , הישר  $k = y$  חותך את גраф הפונקציה: (1) בנקודה אחת. (2) בשתי נקודות. (3) באף נקודה.

2. לgraf הפונקציה  $f(x) = \frac{2x^2 + ax}{x^2 - 7x + 10}$  יש נקודת קיצון ב-  $-3 = x$ . מצא את  $a$ .

ב. חקור את הפונקציה ומצא: תחומי הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, תחומי עלייה וירידה, נקודות קיצון, אסימפטוטות מקבילות לצירים.

ג. שרטט סקיצה של גраф הפונקציה.

ד. בכל אחת משתי נקודות הקיצון של הפונקציה מעבירים משיק לגראף הפונקציה. חשב את המרחק בין שני המשיקים.

3. הישר  $1 - x = y$  הוא אסימפטוטה לפונקציה  $x = \frac{ax + 16}{x^2 - 3x - b}$ . בנקודה  $2 = x$  לפונקציה יש נקודת קיצון. מצא את  $a$  ואת  $b$ .

ב. מצא: תחומי הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, אסימפטוטות מקבילות לצירים, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה.

ג. שרטט סקיצה של גראף הפונקציה.

ד. דרך כל אחת משתי נקודות הקיצון של הפונקציה מעבירים ישר המקביל לציר  $-x$  וישר המקביל לציר  $-y$ . ארבעת הישרים הנ"ל יוצרים מלבן. חשב את שטח המלבן.

4. לפונקציה  $f(x) = \frac{ax^2 + 8x - 28}{x^2 - 4}$  יש אסימפטוטה אופקית  $2 = y$ . מצא את  $a$ .

ב. מצא: תחומי הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, אסימפטוטות מקבילות לצירים, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה.

ג. שרטט סקיצה של גראף הפונקציה.

ד. (1) מצא את נקודת החיתוך בין גראף הפונקציה לבין האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.

(2) מצא לאיילו ערך  $x$  גראף הפונקציה נמצא מעל האסימפטוטה האופקית שלו.

5. לפונקציה  $f(x) = \frac{2x^3 + ax}{x^2 - 1}$  יש מינימום בנקודה  $2 = x$ .

א. מצא את הערך של הפרמטר  $a$ .

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ג. מצא את נקודות המינימום והמקסימום של הפונקציה.

ד. כמה פתרונות יש למשוואה  $? f(x) = 7$ ?

6.

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{Ax^2 + x - 2}{x^2 - x - 2}$$

בנקודה שבה  $x = 1$  שיפוע המשיק הוא  $\frac{3}{2}$ .

א. מצא את הפונקציה  $f(x)$ .

ב. מצא אסימפטוטות לפונקציה המקבילות לצירים.

ג. הפונקציה  $f(x) = g(x) + k$  מקיימת:  $g(x) = 3f(x) + k$ . האסימפטוטה האופקית של הפונקציה  $f(x)$  היא  $y = 5$ . מצא את הערך של  $k$ .

7.

$$\text{גרף הפונקציה } f(x) = \frac{x^2 - x - m}{x^2 - 2} \text{ חותך את האסימפטוטה האופקית שלו}$$

ב-  $x = -2$ .

א. מצא את  $m$ .

ב. מצא תחום הגדרה, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, נקודות חיתוך עם הצירים, אסימפטוטות מקבילות לצירים.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. מצא אילו ערכים של  $k$ , יש למשווה  $k = f(x)$ :

(1) פתרון אחד. (2) שני פתרונות. (3) אף פתרון.

8.

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{x-2}{x^2 - kx}$$

תחום ההגדרה של הפונקציה הוא  $x \neq 0, x \neq 5$ .

א. מצא את הערך של  $k$ .

ב. הוכח שהפונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים ואת האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ד. מהם תחומי החיביות והשליליות של הפונקציה?

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

9.

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{x-k}{x-3}, k \neq 3$$

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. לאיilo ערכים של  $k$  הפונקציה  $f(x)$  יורדת לכל  $x$  בתחום ההגדרה?

ג. ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה  $x = k$  מקביל לישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה  $x = 5$ . מצא את הערך של  $k$ , אם נתון כי הפונקציה יורדת לכל  $x$  בתחום ההגדרה.

10.

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{x^2 - k}{x^2 - 9}, (k \neq 9)$$

א. מצא את שיעור ה- $x$  של נקודת הקיצון של הפונקציה

והבע באמצעות  $k$  את שיעור ה- $y$  של הנקודה.

ב. ישר המשיק לפונקציה בנקודה שבה  $x = 2$  מקביל לציר ה- $x$ . מצא את הערך של  $k$ .

ג. הוכח שפונקציית  $f(x)$  היא פונקציה זוגית.

11. נתונה הפונקציה  $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$ .

- א. מצא : (1) תחום הגדרה. (2) נקודות קיצון. (3) תחומי עלייה וירידה.  
 (4) נקודות חיתוך עם הצירים. (5) אסימפטוטות מקבילות לצירים.
- ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. נתונה הפונקציה  $g(x) = \frac{-1}{1-x^2}$ . בהסתמך על סעיפים א' ו-ב' בלבד

(כלומר מבייל לחזור את הפונקציה  $(x)g$ ) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה  $(x)g$  וקבע את סוג הקיצון.

12. נתונה הפונקציה  $f(x) = \frac{-8x}{x^2+4}$ .

- א. מצא : (1) תחום הגדרה. (2) נקודות קיצון. (3) תחומי עלייה וירידה.  
 (4) נקודות חיתוך עם הצירים. (5) אסימפטוטות מקבילות לצירים.
- ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
- ג. הפונקציה  $(x)g$  היא נגזרת של הפונקציה  $(x)f$ , כלומר  $(x)'g = f(x)$ .  
 شرط בתחום  $2 \leq x \leq -2$  את גרף הפונקציה  $(x)g$ .  
 הנה שבתחום הניל יש לפונקציה  $(x)g$  נקודת קיצון אחת בלבד.

13. נתונה הפונקציה  $f(x) = \frac{x^2}{3-x}$ .

- א. מצא : (1) תחום הגדרה. (2) נקודות קיצון. (3) תחומי עלייה וירידה.  
 (4) נקודות חיתוך עם הצירים. (5) אסימפטוטות מקבילות לצירים.
- ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
- ג. מצא את התחומים שבו הפונקציה  $(x)f$  שלילית וגם הנגזרת  $(x)'f$  שלילית.

14. נתונה הפונקציה  $y = \frac{1}{x^2-2kx}$ ,  $k > 0$ . הבע באמצעות  $k$  את שיעורי

נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוג הקיצון.

15. נתונה הפונקציה  $y = \frac{x^2}{x+a}$  ( $a > 0$ ).

- א. חזור את הפונקציה ומצא : תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, אסימפטוטות מקבילות לצירים, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה (במידת הצורך הבע באמצעות  $a$ ).
- ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

### תשובות:

1. א. תחום הגדרה : כל  $x$ .

נקודות קיצון : (4;2) מקסימום, (-1;-2) מינימום.

עליה :  $x < 4$ , ירידה :  $x > 4$  או  $-2 < x$ .


נקודות חיתוך :  $(0;0)$ ,  $(-8;0)$ .

אסימפטוטות :  $y=1$ .


ג. (1)  $k=1$  או  $k=2$  או  $k=-1$ .

(2)  $k \neq 1$ ,  $-1 < k < 2$ .


(3)  $k > 2$  או  $k < -1$ .




2. א. 6. ב. תחום הגדרה :  $x \neq 2$ ,  $x \neq 5$ .



נקודות חיתוך:  $(-3;0), (0;0)$   
 עלייה:  $-1 < x < 2$  או  $2 < x < 3$   
 ירידה:  $x > 5$  או  $3 < x < 5$   
 $(3; -\frac{2}{9})$  מקסימום,  $(-\frac{2}{9}; -1)$  מינימום.  
 אסימפטוטות:  $y = 2$ ,  $x = 2$ .  $17\frac{7}{9}$ .




- א.  $x \neq -1, x \neq 4$ . ב. תחום הגדרה:  $b = 4, a = -2$ .  
 נקודות חיתוך:  $(0; -4)$ .  
 אסימפטוטות:  $y = 0, x = -1$ .  
 נקודות קיצון:  $(2; -2)$  מקסימום,  
 $(-0.08; -14)$  מינימום.  
 עלייה:  $x < -1$  או  $-1 < x < 2$  או  $x > 4$ .  
 ירידה:  $23.04$ . ד.  $2 < x < 4$  או  $4 < x < 14$ .




- א.  $x \neq -2, x \neq 2$ . ב. תחום הגדרה:  $(-6.243; 0), (2.243; 0)$ .  
 נקודות חיתוך:  $(0; 7)$ .  
 אסימפטוטות:  $y = 2, x = -2$ .  
 נקודות קיצון:  $(4; 3)$  מקסימום,  
 $(1; 6)$  מינימום. עלייה:  $2 < x < 4$  או  
 $1 < x < 2$ . ירידה:  $x > 4$  או  
 $x < -2$  או  $-2 < x < 1$ .  
 ד.  $-2 < x < 2$  או  $x > 2.5$ .

- א. 1. ב.  $x = -1$ ,  $x = 1$ . ג.  $(2; 6.4)$  מינימום,  $(-2; -6.4)$  מקסימום.  
 ד. שלושה.

$$\text{. 2. ג. } x = 2, x = -1, y = 1. \text{ ב. } f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x - 2}. \text{ א. } .6$$




- א.  $x \neq 0$ . ב. תחום הגדרה:  $m = 2$ .  
 נקודות קיצון:  $(-4; 1\frac{1}{8})$  מקסימום.  
 עלייה:  $0 > x$  או  $-4 < x < 0$ . ירידה:  $x < -4$ ,  
 $(-1; 0), (2; 0)$ .  
 נקודות חיתוך:  $y = 1, x = 0$ .  
 אסימפטוטות:  $. k > 1\frac{1}{8}$  (3).  $k \neq 1, k < 1\frac{1}{8}$  (2).  $k = 1\frac{1}{8}$  (1).  
 ד.  $1 < k < 1\frac{1}{8}$  או  $k = 1$ .



- א. 5. ב.  $k < 3$ ,  $k \neq 2$ . ג.  $(2; 0)$ .  
 נקודות חיתוך:  
 אסימפטוטות:  $y = 0, x = 5, x = 0$ .  
 ד. חיוביות:  $0 < x < 2$  או  $x > 5$ .  
 שליליות:  $x < 0$  או  $2 < x < 5$ .  
 א. 1. ג.  $x \neq 3$ .

.18 ב.  $y = \frac{k}{x}$ ,  $x = 0$  .10 א.



.11 א.  $x \neq -1, x \neq 1$  (1) .11 ב.


(2) מינימום.

(3) עלייה:  $0 < x < 1$  או  $x > 1$

ירידת:  $-1 < x < 0$  או  $x < -1$

.4 (0;1) .(5) .(0;1) .(4)

.ג. (0;-1) מקסימום.



.12 א. (1) כל x .12 ב.

(2)

(3)

מינימום, (2;-2) מינימום.

עליה:  $x > 2$  או  $x < -2$ ,

$-2 < x < 2$ :

.y = 0 (5) .(0;0) (4)




.א.  $x \neq 3$  (1) .13 ב.

מינימום, (0;0) (2) מקסימום.


(3) עלייה:  $0 < x < 3$  או  $3 < x < 6$

ירידת:  $x > 6$  או  $x < 0$

.x > 6 (5) .(0;0) (4)



.14 . $k; -\frac{1}{k^2}$  מקסימום.



.15 א. תחום הגדלה:  $x \neq -a$  .נקודות חיתוך: (0;0)

אסימפטוטות:  $x = -a$ .

נקודות קיצון: (0;0) מינימום,

(-2a; -4a) מקסימום.

עליה:  $x > 0$  או  $x < -2a$

.ירידת:  $-2a < x < -a$  או  $-a < x < 0$